

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom : Kompolti



ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

Préparation de l'échantillon selon méthode interne – séchage préalable à 100°C durant 4 heures

Méthode d'analyse quantitative : LBSTRK005 - HPLC – PDA

Analyses Quantitative : HPLC Shimadzu

Analyte	Résultat	Unité
CBD – cannabidiol	8.114	% (m/m)
CBDA – acide cannabidiolique	0.242	% (m/m)
CBD_{total}	8.326	% (m/m)
Δ ⁹ -THC – delta9-tetrahydrocannabinol	0.292	% (m/m)
THCA – acide tetrahydrocannabinolique	<0,005	% (m/m)
Δ⁹-THC_{total}	0.292	% (m/m)
Δ ⁸ -THC – delta8-tetrahydrocannabinol	<0,005	% (m/m)
THCVA – acide tetrahydrocannabivarique	<0,005	% (m/m)
CBG – cannabigerol	0.079	% (m/m)
CBGA – acide cannabigerolique	0.010	% (m/m)
CBG_{total}	0.087	% (m/m)
CBN – cannabinol	<0,005	% (m/m)
CBNA – acide cannabinolique	<0,005	% (m/m)
CBC - cannabichromene	0.415	% (m/m)
CBCA – acide cannabichromenique	<0,005	% (m/m)
CBDV – cannabidivarine	0.014	% (m/m)
CBL – cannabicyclol	<0,005	% (m/m)

Afin de quantifier la teneur totale en THC, il est nécessaire de prendre en considération le %Δ⁹THC, ainsi que le %THCA (Forme acide du Δ⁹THC). La méthode de calcul reconnue du %THC_{total} par analyse HPLC est donc la suivante :

$$\% \text{ THC}_{\text{total}} = \% \text{ THC} + (\% \text{ THCA} \times 0,877)$$

Ce principe est également transposé au calcul du pourcentage du CBD_{total} et CBG_{total} en prenant en compte leur forme acide respective : le CBDA et le CBGA.

Validé par : Dr Renaud BOISSEAU

Responsable Laboratoire – Docteur en Chimie Analytique

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom : Northwest



ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

Préparation de l'échantillon selon méthode interne – séchage préalable à 100°C durant 4 heures

Méthode d'analyse quantitative : LBSTRK005 - HPLC – PDA

Analyses Quantitative : HPLC Shimadzu

Analyte	Résultat	Unité
CBD – cannabidiol	8.007	% (m/m)
CBDA – acide cannabidiolique	0.236	% (m/m)
CBD_{total}	8.214	% (m/m)
Δ ⁹ -THC – delta9-tetrahydrocannabinol	0.289	% (m/m)
THCA – acide tetrahydrocannabinolique	<0,005	% (m/m)
Δ⁹-THC_{total}	0.289	% (m/m)
Δ ⁸ -THC – delta8-tetrahydrocannabinol	<0,005	% (m/m)
THCVA – acide tetrahydrocannabivarique	<0,005	% (m/m)
CBG – cannabigerol	0.301	% (m/m)
CBGA – acide cannabigerolique	0.010	% (m/m)
CBG_{total}	0.310	% (m/m)
CBN – cannabinol	<0,005	% (m/m)
CBNA – acide cannabinolique	<0,005	% (m/m)
CBC - cannabichromene	0.895	% (m/m)
CBCA – acide cannabichroménique	<0,005	% (m/m)
CBDV – cannabidivarine	0.025	% (m/m)
CBL – cannabicyclol	<0,005	% (m/m)

Afin de quantifier la teneur totale en THC, il est nécessaire de prendre en considération le %Δ⁹THC, ainsi que le %THCA (Forme acide du Δ⁹THC). La méthode de calcul reconnue du %THC_{total} par analyse HPLC est donc la suivante :

$$\% \text{ THC}_{\text{total}} = \% \text{ THC} + (\% \text{ THCA} \times 0,877)$$

Ce principe est également transposé au calcul du pourcentage du CBD_{total} et CBG_{total} en prenant en compte leur forme acide respective : le CBDA et le CBGA.

Validé par : Dr Renaud BOISSEAU

Responsable Laboratoire – Docteur en Chimie Analytique